

症例 2-1

71 歳、閉経後女性 乳がん術後

ER 90%、PgR 80%、HER2 0、腫瘍径 7mm、組織学的異形度 1、Ki67 7%

センチネルリンパ生検 陰性 (0/1)

A 病院

Rp 1					
アリミデックス 1mg	1T	1 日 1 回	朝食後		14 日分

B 医院

Rp 1					
アムロジピン 5mg	1T				
カルデナリン 2mg	1T				
エビスタ 60mg	1T	1 日 1 回	朝食後		28 日分
Rp 2					
ファモスタジン 20mg	2T	1 日 2 回	朝・夕食後		28 日分

1. AI 剤服用中に出現する副作用とその対応は何か
2. 今回の処方薬で処方監査する際の注意点および疑義照会すべき点はあるか?

症例 2-2

77 歳、閉経後女性、乳がん術後

腎機能、肝機能：問題なし、血算：問題なし

ER100% PgR60% HER2 0、腫瘍径 14mm、組織学的異形度 1、

センチネルリンパ節生検 陰性 (0/2)

A 医院

Rp 1					
メチコバル錠 250 μ g	6 錠				
ユベラ N カプセル 100mg	3 錠	1 日 3 回	毎食後		14 日分
Rp 2					
メイラックス錠 2mg	1 錠				
ルボックス錠 25	1 錠	1 日 1 回	就寝前		14 日分
Rp 3					
ガスターD 錠 10mg	2 錠	1 日 2 回	朝食後・就寝前		14 日分
Rp 4					
ノルバスク錠 5mg	1 錠				
ディオバン錠 80mg	1 錠	1 日 1 回	朝食後		14 日分
Rp 5					
メバロチン錠 5	1 錠	1 日 1 回	夕食後		14 日分

上記服用中の患者が、タスオミンが開始となる

B 病院

Rp1					
タスオミン錠 20mg	1 錠	1 日 1 回	朝食後		14 日分

1. タモキシフェン服用中に出現する副作用とその対策は何か?
2. 今回の処方薬で処方監査する際の注意点および疑義照会すべき点はあるか?

症例 2-3

36 歳、女性、化学療法中に閉経、乳がん術前化学療法実施後の術後
腎機能、肝機能：問題なし、血算：問題なし

ER 3+ PgR - HER2 3+、腫瘍径 21mm、組織学的異形度 2、
センチネルリンパ節生検 陽性（3/21）

術前化学療法が終了し、手術後最初の来局

「ハーセプチンはまだやっています。ゾラデックスはまだしないそうです。」

Rp 1					
マグラックス錠	250mg	3 錠	1 日 3 回	毎食後	14 日分
Rp 2					
ノルバデックス	20mg	1 錠	1 日 1 回	朝食後	14 日分

1. タモキシフェン服用中に出現する副作用とその対策は何か?
2. ゾラデックスはどのような状況になれば使用するようになるのか?

参考図書・参考資料

- 乳癌診療ガイドライン 1. 薬物療法 2010 年版
編集：日本乳癌学会
出版：金原出版
- 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2009 年版
編集：日本乳癌学会
出版：金原出版
- がん診療レジデントマニュアル 第 5 版
編集：国立がん研究センター内科レジデント
出版：医学書院