

症例 1-1

79 歳、男性

腎機能、肝機能：問題なし

血算：問題なし

直腸がん (Rb) (直腸低位前方切除術後、人工肛門造設術後)

pT3N2M0:StageⅢb

165cm,59kg

術後薬物療法として、UFT/Uzel 併用療法が開始された。

Rp 1					
ユーエフティー配合カプセル 100	5 Cp	1 日 3 回	毎食後 (2 錠-2 錠-1 錠)	14 日分	
Rp 2					
ユーゼル錠 25mg	3 錠	1 日 3 回	毎食後	14 日分	
Rp 3					
ガスモチン錠 5mg	3 錠	1 日 3 回	毎食前	14 日分	
Rp 4					
コロネル細粒 83.3%	1.8g	1 日 3 回	毎食後	14 日分	
Rp 5					
ツムラ大建中湯エキス顆粒	7.5g	1 日 3 回	毎食前	14 日分	

1. ユーエフティー・ユーゼル使用中に出現する副作用は何か?
2. 出現する副作用に対する標準的あるいは一般的な対応は何か?
3. 今回の処方でも処方監査する際の注意点および疑義照会すべき点はあるか?

症例 1-2

65 歳 男性

腎機能、肝機能：問題なし

血算：問題なし

直腸がん (Rs) (直腸低位前方切除術後)

pT3(ss)N0M0:Stage II

173 cm、80 kg

術後薬物療法として、Xeloda (カペシタビン) 療法が開始された。

Rp.1					
ゼローダ錠 300 mg	16 錠	1 日 2 回	朝夕食後		14 日分
Rp.2					
ヒルドイドソフト軟膏	50g	1 日 2 回			
Rp.3					
ピドキサール錠 10 mg	6 錠	1 日 3 回	毎食後		21 日分
Rp.4					
プロテカジン錠 10	2 錠	1 日 2 回	朝夕食後		21 日分
Rp.5					
マグミット錠 250 mg	3 錠	1 日 3 回	毎食後		21 日分
Rp.6					
プリンペラン錠 5	1 錠	吐き気時			10 回分

1. ゼローダ内服中に出現する副作用は何か?
2. 出現する副作用に対する標準的あるいは一般的な対応は何か?
3. 今回の処方で処方監査する際の注意点および疑義照会すべき点はあるか?

症例 1-3

54 歳 女性

腎機能、肝機能：問題なし

血算：問題なし

進行結腸がん（腹腔鏡補助下右半結腸切除術後）

pT3N1cM0:Stage III b（大腸がん取扱い規約第 7 版）

152 cm、51 kg

術後薬物療法として、XELOX（カペシタビン・オキサリプラチン）療法が開始された。

「注射した腕が痛いです。」

Rp 1					
ゼロータ錠 300	10 錠	1 日 2 回	朝夕食後		14 日分
Rp 2					
ピドキサル錠 10 mg	3 錠	1 日 3 回	毎食後		21 日分
Rp 3					
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	7.5g	1 日 3 回	毎食後		21 日分
Rp 4					
親水軟膏	100g	必要に応じて			

1. XELOX 療法施行中に出現する副作用は何か？
2. 出現する副作用に対する標準的あるいは一般的な対応は何か？
3. 今回の処方で処方監査する際の注意点および疑義照会すべき点はあるか？